


C Egon, A Boudet, H de Bouët du Portal, MC Lanoue

OMÉDIT Centre- Val de Loire, Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques de la région Centre

Introduction



Matériel et méthodes

Analyse **qualitative** et **quantitative** du suivi des initiations de prescription hors référentiel (HR) pour les **ANTICANCEREUX**

Justification de ces prescriptions par:

- un argumentaire bibliographique et de qualité proposés par le prescripteur
- la présence d'une RCP
- des éléments cliniques du patient (stade de la pathologie, ligne de traitement...)

Utilisation des recommandations de l'ANSM et du thésaurus régional des protocoles en cancérologie

➔ analyse pour l'année **2015** sur **18 établissements** de la région

Résultats

6410 initiations de prescription en sus des GHS

56 % pour les anticancéreux

13 % dans des indications HR

Les initiations de molécules anticancéreuses concernent principalement les spécialités de **pneumologie** (30%) et l'**hématologie** (27%)

Rituximab ➔ 30% des initiations

51% en hématologie (lymphomes, maladie de Waldenström...)

26% en néphrologie (glomérulonéphrite, prévention du rejet de greffe...)

Pémétréxed ➔ 26% des initiations

100% en pneumologie dans les carcinomes bronchiques

Bévacizumab ➔ 14% des initiations

39% en neurologie dans le glioblastome

36% dans les indications d'ophtalmologie hors cancérologie


19% en gynécologie.

56,5% des prescriptions validées en RCP


65% avec références **bibliographiques**

6,5% avec un avis d'expert

Répartition des initiations HR de traitement par molécules



Répartition des initiations HR de traitement par organes



Conclusion

Ces analyses qualitative et quantitative du suivi des initiations de prescription HR sont menées dans le but de **sensibiliser les professionnels à l'amélioration du suivi** des produits facturés en sus des GHS dans la perspective d'éventuels **contrôles de l'assurance maladie**.

Ce bilan est réalisé chaque semestre afin de suivre l'évolution des prescriptions HR au niveau régional et constitue un **indicateur régional** du bon usage des anticancéreux inscrits sur la liste en sus,