



MÉTHOTREXATE PAR A VOIE ORALE : COMMENT SÉCURISER LE RYTHME D'ADMINISTRATION ?



Le **méthotrexate** est un **médicament à risque**. Je respecte la **règle des « 5B »** de la Haute Autorité de Santé. La prise de méthotrexate par **voie orale** s'effectue **une seule fois par semaine**. De graves événements indésirables ont été rapportés en cas d'administration quotidienne.

B

Patient
Médicament
Dose
Voie
Moment


**Le méthotrexate
par voie orale**
(IMETH®,
NOVATREX®,
METHOTREXATE BELLON®,
METHOTREXATE ACCORD)

JAMAIS PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE

Sur le **site de l'ANSM**, un **feuillet** est **destiné aux personnels des EHPAD** qui prennent en charge des **patients sous méthotrexate**



**J'ai un doute ?
Je demande !**



Pour éviter tout risque lors de l'administration du méthotrexate par voie orale :

- 1 **Être vigilant lors de toute administration** de méthotrexate par voie orale
- 2 **Ne pas le déconditionner à l'avance** pour ne **pas s'exposer à ce médicament toxique**
- 3 **Vérifier dans le dossier du patient la posologie du méthotrexate** et **auprès du médecin ou pharmacien en cas de doute**
- 4 **Tracer le jour d'administration** du méthotrexate
- 5 **Définir un jour de prise hebdomadaire pour l'ensemble des résidents** traités par du méthotrexate par voie orale
- 6 **Remplir le feuillet disponible sur le site de l'ANSM** permettant de **tracer l'administration du méthotrexate au patient**
- 7 **Informier immédiatement un médecin devant l'un de ces signes de surdosage : ecchymoses (bleus) ou saignements inexpliqués, fatigue inhabituelle, fièvre, plaies ou inflammation de la bouche, nausées, vomissements, diarrhées sévères, selles foncées ou sang dans les selles**