

*Exemple de fiche de surveillance d'une PCA dans le cadre de douleurs chroniques chez l'adulte
(à adapter en fonction du nombre de surveillance par jour effectué)*

Patient : nom, prénom	J1 (date)			J2 (date)			J3 (date)		
Produit									
Dose continue									
Dose bolus									
Période réfractaire									
Heure									
IDE (paraphe)									
Nombre de bolus reçus									
Nombre de bolus demandés									
Dose totale reçue sur 24h (mg)									
EVA ou EN (<i>pas de douleur = 0 → douleur maximale = 10</i>)									
Sédation (échelle de Rudkin) S1 = éveillé, orienté S2 = somnolent S3= yeux fermés, répond à l'appel S4= yeux fermés, répond à stimulation tactile légère S5 = yeux fermés, ne répondant pas à une stimulation tactile légère									
Fréquence respiratoire R0 = respi sans gêne FR>10 R1 = respi ronflante FR>10 R2 = respi irrégulière FR<10 R3 = pauses, apnée									
Effets secondaires : Constipation (C) Vomissements, nausées (V) Hallucinations/ Cauchemars (H) Rétention urinaire (RU) Clonies (CL)									
Vérification du volume résiduel en ml sur l'écran de la PCA (Vr) Vérification visuelle du volume résiduel dans le pochon (VrP) Changement réservoir (Ré) Surveillance autonomie pile (Pi)									
Changement pansement/aiguille (PA)									

Document proposé par l'OMEDIT Haute-Normandie en collaboration avec l'Unité de Médecine Palliative et le Service Pharmacie du CHU de Rouen.

Version Août 2013

Document à adapter et valider pour votre structure