

Fiche Information Patient **ZYTIGA® (abiratérone)**

Qui peut prescrire ZYTIGA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer ZYTIGA® ? : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations:

- Comprimés de couleur blanche dosés à 250 mg
- Flacon de 120 comprimés (3600 € la boîte)



Comment prendre ZYTIGA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.

1h avant

- La posologie habituelle de ZYTIGA® est de 1000 mg soit **4 comprimés par jour**, en une seule prise.



- **Les comprimés doivent être pris au moins 1 heure avant un repas ou 2 heures après**, avec un grand verre d'eau, toujours à la même heure.

- Les comprimés ne doivent pas être croqués, ni écrasés.

2 h après

Rappel : votre traitement par ZYTIGA® doit être associé à la **prednisone** ou à la **prednisolone 10 mg**, à prendre en une prise par jour le matin.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de ZYTIGA®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements: attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

Comment conserver ZYTIGA® ? :

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **ZYTIGA® (abiratérone)**



Le millepertuis peut baisser l'efficacité de **ZYTIGA®**. Il est fortement déconseillé d'en consommer.



Utilisez deux méthodes de **contraception** efficaces (préservatif + autre méthode) pendant le traitement .

Quels sont les effets secondaires du ZYTIGA® (abiratérone) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Hypertension artérielle	Surveillez votre tension artérielle selon le protocole indiqué par votre médecin.	Si vous ressentez des maux de tête, des palpitations, des sensations de vertiges ou des bourdonnements d'oreilles, contactez votre médecin. Si besoin, votre médecin pourra vous prescrire un médicament antihypertenseur.
Œdèmes et rétention d'eau	Pesez-vous régulièrement. Surélevez vos pieds quand vous êtes assis et évitez les vêtements serrés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel.	En cas de prise de poids rapide, consultez votre médecin.
Baisse de potassium (hypokaliémie) dans le sang	Des bilans sanguins réguliers seront réalisés pour surveiller le taux de potassium.	En cas de faiblesse musculaire, contractions musculaires ou palpitations, consultez votre médecin car cela peut être un signe d'hypokaliémie.
Infection urinaire	Buvez au moins 1.5 L d'eau par jour et urinez fréquemment.	Prévenez votre médecin en cas de sensation de brûlures en urinant et/ou en cas de fièvre.
MOINS FREQUENTS		
Augmentation des graisses dans le sang (triglycérides)	Des bilans sanguins réguliers seront réalisés. Privilégiez une alimentation pauvre en glucides. Limitez les apports en féculents, certains fruits (cerises, raisins...), le sucre et les produits sucrés, l'alcool.	