

INLYTA® axitinib

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie ou en oncologie médicale**.



Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.



Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

INLYTA® se présente en plaquettes thermoformées de 56 comprimés pelliculés de 4 dosages :

 <p>Comprimé rouge ovale de 1 mg (688,80 € HT)</p>	<p>Comprimé rouge rond de 3 mg gravé "Pfizer" sur une face et "3 XNB" sur l'autre face (2066,40 € HT).</p>	 <p>Comprimé rouge triangulaire de 5 mg (3444,0 € HT)</p>	<p>Comprimé rouge en losange de 7 mg gravé "Pfizer" sur une face et "7 XNB" sur l'autre face (4821,60 € HT).</p>
--	---	--	---



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. **La dose initiale est de 5 mg deux fois par jour.**

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



Les comprimés d'INLYTA® sont à avaler entiers avec un **grand verre d'eau en deux prises par jour** au cours ou en dehors des repas à 12 heures d'intervalle. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**



Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par INLYTA®.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)



N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.



Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (anti-acides). En cas de besoin, ces médicaments doivent être pris à distance d'INLYTA®. Demandez conseil à votre pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<p>Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille</p>	<p>Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.</p>	<p>Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par anti-hypertenseur vous sera prescrit si besoin.</p>
<p>Nausées et vomissements</p>	<p>Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.</p>	<p>Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).</p>

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants.
Fatigue	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Perte d'appétit	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Eruptions et sécheresse cutanées	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions prolongées au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Evitez le soleil et l'eau chaude. Les vêtements et les chaussures trop serrés ne sont pas conseillés. Si possible, évitez les travaux irritants pour les mains et l'utilisation des pansements adhésifs. Utilisez plutôt un savon doux sans parfum. La station debout et les marches prolongées ne sont pas conseillées. Une consultation chez un pédicure pourrait être utile avant et après le traitement.	Il s'agit d'un syndrome mains-pieds. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes : contactez votre médecin.
Inflammation de la bouche Altération du goût	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	Demandez conseil à votre pharmacien En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Troubles de la voix		Contactez votre médecin
Une perte de cheveux peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.		
⚠ Si vous ressentez des effets non mentionnés , n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.		

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :



- gonflement, rougeur et douleur de la paume des mains et de la plante des pieds.
- maux de ventre ou d'estomac intenses qui ne disparaissent pas.
- de confusion, de troubles visuels et du comportement



Il est **déconseillé de prendre INLYTA® pendant la grossesse et l'allaitement.**



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés INLYTA® ou en cas de vomissements, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Ce médicament contient du lactose. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.

REMARQUES :