

Fiche Information Patient **ENDOXAN® (Cyclophosphamide)**

Qui peut prescrire ENDOXAN® ? : Ce médicament peut être prescrit par un **médecin hospitalier** ou **de ville**.

Où se procurer ENDOXAN® ? : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations:

- Comprimés de couleur blanche dosés à 50 mg
- Boîte de 50 comprimés (11,93 € la boîte)



Comment prendre ENDOXAN® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



L'administration se fait habituellement par **cycles courts de 1 à 14 jours**, répétée toutes les 2 à 4 semaines. Un traitement prolongé est également possible à des posologies plus faibles.

Les comprimés doivent être avalés entiers en une seule prise le matin à jeun avec un grand verre d'eau.

Les comprimés ne doivent pas être croqués, ni sucés, ni broyés.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation d'ENDOXAN®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements: attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

Comment conserver ENDOXAN® ? :

Conserver les comprimés à température inférieure à 25°C.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient ENDOXAN® (Cyclophosphamide)



Pendant le traitement, **il est important de boire davantage** pour maintenir le bon fonctionnement des reins (si possible 1,5 litre par jour).



Utilisez une méthode de **contraception** efficace pendant le traitement.



Attention, ce médicament **contient du lactose**.

Quels sont les effets secondaires du ENDOXAN® (Cyclophosphamide) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Nausées, vomissements	Prenez les médicaments prescrits (généralement 30 min avant la chimiothérapie) contre les nausées et vomissements, mangez lentement et fractionnez les repas. Evitez les aliments gras, frits et épicés.	Si les vomissements persistent, prévenez votre médecin. En cas de perte de poids, prévenez le médecin
Inflammations de la bouche	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure, contactez le médecin prescripteur.
Signes d'infection : fièvre, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	Contrôlez votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souples. Attention aux coupures et blessures. Ne pas utiliser de thermomètre rectal.	En cas de saignements importants, contactez le médecin prescripteur.
Présence de sang dans les urines, difficultés à uriner	Buvez si possible beaucoup d'eau type Vichy Saint Yorre (alcaline)	En cas de douleurs intenses, de difficultés à uriner ou de sang dans les urines, contactez immédiatement le médecin.