

## Fiche Information Patient TAFINLAR® (Dabrafenib)

**Qui peut prescrire TAFINLAR® ?** : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

**Où se procurer TAFINLAR® ?** : Chez votre pharmacien habituel.

### Formes/présentations :

- Flacons de 120 gélules rouges dosées à 50 mg (4602€ la boîte)
- Flacons de 120 gélules roses dosées à 75 mg (6888 € la boîte)



**Comment prendre TAFINLAR® ?** : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin. **La dose habituelle est de 150 mg par jour (soit 2 gélules de 75 mg).**



Les gélules de TAFINLAR® **sont à avaler entières avec un verre d'eau, en 2 prises par jour à 12 heures d'intervalle, en dehors des repas : 1 heure avant ou 2 heures après le repas.** Essayez de les prendre tous les jours aux mêmes heures.

*Les gélules ne doivent pas être ni brisées, ni mâchées.*



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de TAFINLAR®.



**En cas d'oubli** : si vous avez oublié une prise de médicaments à l'heure habituelle, prenez votre dose manquée s'il reste plus de 6 heures avant la prise suivante. Ne doublez pas les doses.

### Comment conserver TAFINLAR® ? :



Conservez les gélules à température ambiante dans leur flacon d'origine, et à l'abri de l'humidité.

### Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration** ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie toutes les gélules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

## Fiche Information Patient TAFINLAR® (Dabrafenib)



Le pamplemousse (jus et pulpe) est déconseillé pendant toute la durée du traitement.



Le millepertuis sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes, ...) est à éviter pendant toute la durée du traitement



Le TAFINLAR® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Il est recommandé aux femmes en âge de procréer d'avoir recours à une méthode de contraception efficace pendant le traitement et 4 semaines après l'arrêt du traitement.

### Quels sont les effets secondaires les plus fréquents de TAFINLAR® ?

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun*

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Perte d'appétit	Mangez les aliments que vous aimez et essayez de prendre régulièrement des petits repas.	En cas de perte de poids, parlez-en à votre médecin.
Nausées, Vomissements, Diarrhées, Constipation	<u>Vomissements</u> : Buvez plutôt entre les repas. Évitez les aliments frits, gras et épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers. <u>Diarrhées</u> : Évitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Parlez-en à votre médecin, des médicaments symptomatiques peuvent vous être prescrits.
Syndrome main-pied : sécheresse de la peau et rougeur des mains et des pieds. Douleurs dans les mains et les pieds	Évitez toute exposition des mains et des pieds à la chaleur, et toute compression des extrémités (gants, chaussures trop serrées...) Utilisez un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum.	Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Appliquez une crème émolliente. Parlez-en à votre médecin et à votre oncologue, des médicaments peuvent vous être prescrits. Une adaptation de posologie peut être nécessaire.
Fièvre, fatigue, frissons, céphalées	Reposez-vous souvent et faites des exercices légers (marche).	Prudence en cas de conduite de véhicule. En cas de fièvre, consultez votre médecin.
Épaississement de la peau, éruption cutanée, alopecie	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Évitez le soleil et toute exposition à la chaleur.	Une crème hydratante permet de soulager les symptômes.
Arthralgie, myalgie, douleurs dans les extrémités	Assurez-vous d'avoir une literie adaptée, buvez régulièrement, privilégiez les exercices légers et évitez les gestes répétitifs.	La chaleur (serviette chaude) peut vous apporter un soulagement local temporaire. Utilisez un antalgique (paracétamol) et consultez votre médecin traitant.

Malgré le soin apporté à la rédaction des fiches, une erreur a pu s'y glisser.  
Merci de nous en informer en nous contactant par mail : 3C@ch-saintonge.fr