

# ZYDELIG® idélalisib

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en hématologie**.



Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières**.



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement,** veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Rétrocédable et agréé aux collectivités par prolongation des conditions d'inscription au titre de l'ATU (en cours).



Deux présentations sont disponibles, sous forme de flacons de 60 comprimés pelliculés dosés à :  
**100 mg orange**, de forme ovale (3900 € HT).

**150 mg rose**, de forme ovale (3900 € HT).



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.

**Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **150 mg deux fois par jour**.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les comprimés de ZYDELIG® sont à avaler avec un **verre d'eau en deux prises par jour au cours ou en dehors des repas. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**



Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés, ni mâchés ou croqués.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)




**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Diarrhée, inflammation du gros intestin</b>	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée et/ou l'inflammation intestinale. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Eruptions cutanées</b>	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
<b>Diminution du nombre de globules blancs, Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires</b>	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.
<b>Troubles hépatiques</b>	Evitez les aliments frits, gras, trop sucrés et l'alcool.	Faites régulièrement vos analyses biologiques pour contrôler votre fonction hépatique.
<b>Difficulté à respirer, toux</b>	Limitez si possible les contacts avec des personnes ayant une infection contagieuse	Contactez le médecin si ces signes surviennent.
<p>Une <b>augmentation des triglycérides</b> peut survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.</p> <p> Si vous ressentez des <b>effets non mentionnés</b>, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.</p>		

### QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :



- difficultés à respirer, toux, essoufflement ou modification du rythme respiratoire.
- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- Modifications du bilan hépatique.



Il est déconseillé de prendre ZYDELIG® pendant la grossesse et l'allaitement.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de ZYDELIG® :



Depuis moins de 6 heures, prenez la dose manquée.

Depuis plus de 6 heures, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise, sans la doubler, à l'heure normale. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.

REMARQUES :