

Fiche Information Patient GLIVEC® (Imatinib)

Qui peut prescrire GLIVEC® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier.

Où se procurer GLIVEC® ? : Chez votre pharmacien habituel

Formes/présentations :

- Comprimés ronds de couleur orangé dosés à 100 mg
Boîte de 60 comprimés dosés à 100 mg (1175 € la boîte)
- Comprimés ovales de couleur orangé dosés à 400 mg
Boîte de 30 comprimés dosés à 400 mg (2309 € la boîte)



Comment prendre GLIVEC® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



Les comprimés de GLIVEC® **sont à avaler entiers avec un grand verre d'eau, en 1 ou 2 prises par jour, au cours des repas, en position assise** pour réduire le risque d'irritations gastro-intestinales. Attendez au moins une heure avant de vous allonger.
Les comprimés ne doivent pas être broyés, coupés ou croqués.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de GLIVEC®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : **Ne prenez pas la dose manquée, attendez la prise suivante et ne doublez pas les quantités.**

Comment conserver GLIVEC® ? :

Conservez les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **GLIVEC® (Imatinib)**



Evitez l'exposition prolongée **au soleil** et protégez-vous si vous devez le faire.



Le pamplemousse (jus et pulpe) est déconseillé pendant toute la durée du traitement.



L'utilisation de GLIVEC® pendant **la grossesse et l'allaitement est contre-indiquée.**
Utilisez une méthode de contraception efficace.

Quels sont les effets secondaires de GLIVEC® ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, eau gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin qui pourra vous prescrire un traitement.
Nausées, vomissements	Buvez plutôt entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	Le médecin pourra vous prescrire un traitement anti-émétique. Si les vomissements persistent après 24h, prévenez votre médecin.
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil : protégez-vous avec écran total.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Œdèmes des membres	Elevez vos pieds lorsque vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveillez régulièrement votre poids : s'il augmente de façon rapide et inattendue, contactez votre médecin.
Modification du bilan sanguin	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	<u>En cas de signes infectieux</u> (fièvre, toux) ou de <u>saignements inhabituels</u> , prévenez le médecin.
Crampes musculaires, douleurs musculaires	Une hydratation régulière est recommandée. Evitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.	Contactez votre médecin en cas de persistance.