

# MEGACE®

Mégestrol

## CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un **médecin hospitalier** ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.

## PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible sous plaquettes thermoformées:  
- boîte de 30 comprimés blancs dosés à 160 mg.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (<30°C), à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

## POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle. La dose recommandée de MEGACE® est de 160 mg par jour, soit **1 comprimé en une prise par jour**.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**

## PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Rétention hydrique, œdème, prise de poids, augmentation de l'appétit.	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveiller le poids. Si la prise de poids est rapide et inattendue, contacter le médecin.

Des gonflements et des douleurs à la poitrine ainsi que des saignements entre les règles peuvent survenir pendant le traitement.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

## CONSEILS AUX PATIENTS

---



MEGACE® doit être pris **une fois par jour** avec un grand verre d'eau indifféremment pendant ou en dehors des repas.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



Ne pas prendre MEGACE® en cas de grossesse (4 premiers mois) et d'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.



**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Megace®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.**



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



**Contactez rapidement le médecin en cas de :**

- gonflement et/ou douleur au niveau d'un membre, difficulté à respirer
- prise de poids rapide et inattendue.