

# PURINETHOL® mercaptopurine

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE



Ce médicament est prescrit par votre **médecin hospitalier ou de ville**.  
Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.



Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.



**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle.** Merci de les rapporter à votre pharmacien.

**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.**

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Boîte de 25 comprimés sécables, jaune pâle, dosés à 50 mg (66,25 €).



Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

**Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**



Les comprimés de PURINETHOL® sont à avaler **entiers avec un grand verre d'eau, 15 à 30 minutes avant un repas.**



Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.



**Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonctionnement du rein (si possible 1.5 litre par jour).**



L'alcool est à éviter pendant le traitement.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.


**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**



En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

| EFFETS INDESIRABLES            | PREVENTION  | CONDUITE A TENIR  |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Saignements inhabituels</b> | En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter. Certains médicaments sont déconseillés (aspirine, ibuprofène...). | Prévenez votre médecin.<br>En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines. |

| EFFETS INDESIRABLES   | PREVENTION  | CONDUITE A TENIR   |
|---|---|--|
| <b>Signes d'infection :</b><br>fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires  | Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. | En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.  |
| <b>Nausées et vomissements</b>  | Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.  | Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses.<br>Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).   |
| <b>Diarrhée</b>   | Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.  | Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour). |
| <b>Inflammation de la bouche</b>  | Les aliments acides, épicés et irritants ne sont pas conseillés. Utilisez plutôt une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.   | En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.   |
| <p>Une <b>perte de cheveux</b> peut survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.</p> <p> Si vous ressentez des <b>effets non mentionnés</b>, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.</p> |   |  |

### QUELQUES CONSEILS



**Contactez rapidement le médecin en cas de :**

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- douleurs abdominales, jaunissement de la peau, urines foncées, démangeaisons.
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.



**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de PURINETHOL<sup>®</sup>, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.**

**REMARQUES :**