

TASIGNA®

Nilotinib

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Quatre présentations sont disponibles sous plaquettes thermoformées :

- Boîte de 28 gélules jaune pâle dosées à 150 mg (conditionnement hebdomadaire)
- Boîte de 112 gélules jaune pâle dosées à 150 mg (conditionnement mensuel)
- Boîte de 28 gélules jaune pâle dosées à 200 mg (conditionnement hebdomadaire)
- Boîte de 112 gélules jaune pâle dosées à 200 mg (conditionnement mensuel)

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C, dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité.

POSOLOGIE

L'administration se fait en **deux prises de 300 mg ou 400mg par jour (selon l'indication)** toutes les 12 heures à distance des repas.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires: aspirine, ibuprofène...	En cas de saignement important, contacter le médecin prescripteur.
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfecter soigneusement toute plaie. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contacter le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Constipation	Privilégier une bonne hydratation, une alimentation riche en fibre et une activité physique régulière.	Boire au moins 2 litres d'eau par jour. En cas de constipation prolongée, contacter votre médecin.

Diarrhée	Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Évitez les expositions au soleil. Protection solaire : écran total.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Œdèmes, Rétention d'eau	Élevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Évitez les vêtements serrés.	Surveillez le poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.
Maux de tête, douleur articulaire et musculaire	Reposez-vous souvent, mais faites des exercices légers (marche). Évitez les mouvements trop répétitifs.	En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



La dose doit être administrée par voie orale avec un grand verre d'eau au moins en respectant un intervalle de **12 heures entre chaque prise**.

Aucun aliment ne doit être consommé dans les deux heures précédant une prise de TASIGNA®, ni dans l'heure qui suit.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Ne pas jeter les emballages ni les gélules dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien



Éviter de manger des pamplemousses ou de boire du jus de pamplemousse pendant toute la durée du traitement pas TASIGNA®



Si vous avez oublié de prendre vos gélules de Tasigna®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite à l'heure habituelle et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- signes infectieux (fièvre, toux..)
- saignement anormal, selles noires
- prise de poids rapide et inattendue
- douleur dans la poitrine et abdominale importante.
- œdème, rougeur, gonflement au niveau des membres inférieurs.