

VOTRIENT®

Pazopanib

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par les médecins hospitaliers spécialistes en oncologie ou en hématologie ou par les médecins spécialistes en cancérologie.

Votrient® est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUE

Deux dosages sont disponibles, par flacon de 30 ou 60 comprimés pelliculés :

- 200 mg, comprimés roses
- 400 mg, comprimés blancs

A conserver à température ambiante

POSOLOGIE

La posologie usuelle est de 800 mg une fois par jour. Elle pourra être ajustée par palier de 200 mg en fonction de la tolérance individuelle au traitement et mais ne devra pas excéder 800 mg.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin. Ne prenez aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, les bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Perte d'appétit	Mangez les aliments que vous aimez et essayez de prendre régulièrement des petits repas.	En cas de perte de poids, contactez votre médecin. Des compléments alimentaires pourront vous être prescrits.
Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille	La surveillance de votre cœur est primordiale c'est pourquoi il faut respecter les examens à faire (électrocardiogramme et analyses sanguines). Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.
Fatigue inhabituelle, maux de tête, douleurs articulaires, insomnie	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles.	En cas de fatigue persistante inhabituelle ainsi que de violents maux de tête, informez votre médecin. Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.
Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Evitez le soleil et toute exposition à la chaleur. Evitez les vêtements et les chaussures trop serrées. Utilisez un savon doux sans parfum. Evitez les tâches ménagères et les travaux irritants pour les mains. Evitez la station debout et les marches prolongées. Evitez les pansements adhésifs.	Il s'agit d'un syndrome mains-pieds, contactez immédiatement votre médecin. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes (voir avec votre médecin).

Une modification de la couleur des cheveux, une dépigmentation de la peau et une altération du goût peuvent survenir.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



- Les comprimés de VOTRIENT® se prennent **entiers (ni écrasés, ni coupés), avec un grand verre d'eau, au moins une heure avant ou deux heures après un repas.**



- **Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Votrient® ou en cas de vomissement, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante.** Prenez la dose suivante au moment habituel.



- **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



- Ne prenez pas Votrient® en cas de **grossesse et d'allaitement**. Chez toute femme susceptible de procréer, une méthode de contraception efficace doit être mise en place pendant toute la durée du traitement et jusqu'à au moins 2 semaines après l'arrêt du traitement. En cas de grossesse, la patiente doit être informée des risques potentiels pour le fœtus.



- Evitez de consommer des pamplemousses ou du jus de pamplemousse ou des tisanes au millepertuis durant votre traitement.



- Le Votrient® peut altérer la cicatrisation des plaies. En cas d'intervention chirurgicale programmée, il est recommandé **d'interrompre votre traitement 7 jours avant.**



- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



- Ne laissez pas votre traitement à la portée des enfants



- Ne jetez pas les emballages, ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle. En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- apparition de selles noires ou de sang dans les selles, saignements du nez et de crachats comportant du sang

- gonflement, rougeur, douleur au niveau d'un membre, difficulté à respirer ou de toux anormale

- confusion, troubles visuels et du comportement

- maux de tête inhabituels, palpitations et bourdonnements d'oreille

- coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux, urines foncées, confusion et/ou désorientation

- douleur thoracique oppressante et angoissante pouvant migrer vers le bras gauche et/ou la mâchoire

- apparition brutale d'une difficulté à bouger un membre ou deux membres du même côté et/ou un côté du visage, des difficultés à articuler ou à trouver ses mots, la perte de vision d'un seul œil, des sensations de fourmillements, d'engourdissement sur un seul côté du corps, des vertiges.