

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PATIENT »

Notes personnelles

Ponatinib ICLUSIG®



Présentation et conditions de prescription

- Boîte de 30 comprimés à 45 mg ou de 60 comprimés à 15mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies hospitalières.

Comment prendre ce médicament

- Le ponatinib se prend en une prise par jour avec un verre d'eau, au même moment, pendant ou en dehors du repas. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit, chaque jour et sur toute sa durée.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Laissez le comprimé dans son flacon jusqu'au moment de la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Si vous avez oublié de prendre votre dose de ponatinib, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Notez l'oubli.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement ou de le poursuivre à dose adaptée.



Alertes

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Éviter le pamplemousse (fruit et jus) ou le millepertuis au cours du traitement

Gestion des principaux effets indésirables

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Fréquents		
Démangeaisons, éruption cutanée, assèchement	- Utiliser un savon doux. Appliquez souvent une crème hydratante.	Contactez votre médecin si besoin.
Fièvre, frissons	Reposez-vous souvent. - Limiter les contacts avec les personnes malades. - Lavez-vous les mains fréquemment. - Désinfecter vos plaies.	Contactez votre médecin en cas de température > 38°C.
Saignements	Évitez les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...), l'aspirine	Contactez rapidement votre médecin (en rouge) si saignements inhabituels (nez, urine...)
Diarrhée	- Éviter les aliments trop chauds, épicés et frits. - Éviter le café, le lait, l'alcool. - Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).	- Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. - Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.
Nausées / vomissements	- Essayer de boire souvent, par petites quantités - Faire des repas légers et fréquents en évitant les aliments gras, frits et épicés.	Prendre les antiémétiques prescrits. Appeler votre médecin, en cas de vomissements malgré le traitement.
Constipation	Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...), alimentation riche en fibre et activité physique régulière.	Prendre le traitement laxatif prescrit.
Douleurs abdominales		Contactez votre médecin si besoin.
Céphalées Arthralgie, myalgie		- Prendre du paracétamol si nécessaire (500mg à 1 g par prise, maximum 4 fois/jour). - Contacter votre médecin si les symptômes persistent
Toux, dyspnée		Contactez votre médecin.