

Fiche Information Patient NEXAVAR® (Sorafénib)

Qui peut prescrire NEXAVAR® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer NEXAVAR® ? : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations:

- Comprimés de couleur rouge dosés à 200 mg
- Boîte de 112 comprimés (3426,76 € la boîte)



Comment prendre NEXAVAR® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.

La dose habituelle chez l'adulte est de **2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir**, c'est-à-dire 4 comprimés par jour.



Les comprimés sont à avaler entiers **avec un verre d'eau**, à heure fixe si possible, en dehors des repas ou avec un repas pauvre en graisses (beurre, huile, crème fraîche...). Essayez de respecter un intervalle de 12 heures entre la prise du matin et celle du soir (la prise pouvant parfois être décalée de 1 à 2 heures). Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de NEXAVAR®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : **Ne prenez pas la dose manquée, attendez la prise suivante et ne doublez pas les quantités.**

Comment conserver NEXAVAR® ?

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **NEXAVAR® (Sorafénib)**



NEXAVAR contre-indique l'allaitement.



Utilisez une méthode de contraception efficace.



Le pamplemousse et le Millepertuis sont à éviter avec le NEXAVAR®.

Quels sont les effets secondaires de NEXAVAR® (Sorafénib) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Consultez votre médecin traitant pour une ordonnance d'anti-diarrhéique et suivez la prescription. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour et privilégiez les féculents, les carottes, bananes. Prévenez votre médecin si les signes persistent (+ de 3 diarrhées par jour).
Nausées et vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin si les signes persistent.
Syndrome main-pied : sécheresse de la peau, picotement, gonflement et rougeur des mains et des pieds, voire douleurs dans les mains et les pieds	Evitez toute exposition des mains et des pieds à la chaleur, et toute compression des extrémités (gants, chaussures trop serrées...) Utilisez un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum.	Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes. Consultez votre médecin.
Hypertension artérielle responsable de maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille	Vérifiez régulièrement votre tension artérielle. Faites de l'exercice. Contrôlez votre poids. Limitez votre consommation de sel et d'alcool.	Contactez votre médecin dès l'apparition de l'un de ces signes. Un traitement antihypertenseur vous sera prescrit par votre médecin si besoin.
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez si possible les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C.
Saignements inhabituels	En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter. Certains médicaments sont déconseillés (Aspirine, Ibuprofène...).	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.
Fatigue	Respectez des temps de repos dans la journée et soyez à l'écoute de votre corps.	Prudence en cas de conduite de véhicules