

# SUTENT®

Sunitinib

## CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

## PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Trois présentations sont disponibles sous plaquette thermoformée perforée en doses unitaires:


- Boîte de 28 gélules à 12,5 mg (orange)
- Boîte de 28 gélules à 25 mg (caramel et orange)
- Boîte de 28 gélules à 50 mg (caramel)

Conservez ce médicament à **température ambiante** (moins de + 30°C), à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

## POSOLOGIE

La dose de SUTENT® recommandée est de **50 mg, une fois par jour en continu pendant 28 jours**, suivi d'une période de **14 jours sans traitement**. Le cycle complet dure 6 semaines.

La durée de prescription dépend des associations, du schéma choisi par le prescripteur et des adaptations posologiques. **Elle peut donc varier.**



## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à votre médecin.**

## PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments fris, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenez le médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.
Fatigue inhabituelle	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles.	En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.

Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Évitez le soleil et toute exposition à la chaleur. Évitez les vêtements et les chaussures trop serrées. Utilisez un savon doux. Évitez les tâches ménagères et les travaux irritants pour les mains.	Il s'agit d'un syndrome mains-pieds, contactez immédiatement votre médecin. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, séchez sans frotter. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes (voir avec votre médecin).
Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille	Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Saignements (diminution des plaquettes)	Utilisez une brosse à dent souple. Évitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.

Possible modification du goût, perte d'appétit et infections au niveau de la bouche (aphtes, gingivite...).

D'autres effets indésirables cutanés peuvent survenir telle qu'une modification de la couleur de la peau ou une décoloration de la peau et/ou des cheveux.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

### CONSEILS AUX PATIENTS



Le SUTENT® peut être pris au cours ou en dehors d'un repas. Il se prend à n'importe quel moment de la journée **avec un grand verre d'eau**.



Les gélules ne doivent **jamais** être ouvertes ni broyées.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Ne pas jeter les emballages ni les gélules dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



Ne pas boire de jus de pamplemousse ni manger de **pamplemousse** pendant le traitement.



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



**Si vous avez oublié de prendre vos gélules de Sutent®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.**



Ne pas prendre SUTENT® en cas de grossesse et d'allaitement. Utilisez une méthode de contraception efficace pendant toute la durée du traitement.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.

Prévenez votre médecin en cas d'intervention dentaire importante prévue.



**Contactez rapidement votre médecin en cas de :**

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...). / selles noires, saignements de nez.
- maux de tête inhabituels, sensations de vertiges et de bourdonnement d'oreille ...
- gonflement, rougeur et douleur de la paume des mains et de la plante des pieds.