

Principes généraux

- Ne pas sortir à l'avance les gélules ou les comprimés de leur blister (certains sont sensibles à la lumière, à l'oxygène).
- Ne pas « déconditionner » pour plus de 7 jours. En cas de risque d'oubli de prise, découper l'emballage (blister) et placer dans un pilulier semainier.
- Ne pas couper, écraser les comprimés, ou ouvrir les gélules.
- Ne pas administrer avec de l'eau chaude ou de l'eau gazeuse, du jus de pamplemousse (contre-indiqué avec la plupart des médicaments).

Présentation en 2 parties :

Objectifs : répondre à la demande des infirmiers sur les recommandations quant aux risques d'interactions entre les aliments du repas et les anticancéreux administrés par voie orale.

Sur les noms commerciaux, vous trouverez **des liens** renvoyant chaque molécule à sa fiche correspondante. Vous trouverez une liste sur le site d'Omédit Bretagne regroupant l'intégralité des molécules ayant une fiche VOC à date en cliquant sur le lien suivant : <https://www.omeditbretagne.fr/activites-et-thematiques/cancer/medicaments-anticancereux/fiches-voc/>

- Les anticancéreux oraux « pendant ou après repas » correspondant aux mentions : **privilégiez une administration à heure fixe avec un grand verre d'eau et en fin de repas.**
- Les anticancéreux oraux « à jeun » correspondant aux mentions : **privilégiez une administration à heure fixe le matin à jeun 1 heure avant le repas (ou 3h après une prise de nourriture).**

Anticancéreux oraux avec administration « PENDANT ou APRES REPAS »

Nom commercial	DCI	Recommandations notice
<u>Aromasine</u>	Exémestane	à heure fixe, de préférence après un repas
<u>Bosulif</u>	Bosutinib	De préférence le matin, à heure fixe, pendant un repas
<u>Glivec</u>	Imatinib	à heure fixe, pendant un repas
<u>Hexastat</u>	Altrétamine	à heure fixe, après les repas
<u>Ibrance</u>	Palbociclib	à heure fixe, avec de la nourriture, de préférence pendant un repas
<u>Imbruvica</u>	Ibrutinib	à heure fixe, de préférence pendant un repas
<u>Lonsurf</u>	Trifluridine/Tipiracil	à intervalle d'environ 12h, dans l'heure suivant le repas
<u>Lysodren</u>	Mitotane	à heure fixe, avec un verre d'eau pendant des repas riches en graisses
<u>Navelbine</u>	Vinorelbine	à jour et heure fixe, après un repas
<u>Neofordex</u>	Dexaméthasone	le matin, préférentiellement au milieu du repas
<u>Rydapt</u>	Midostaurine	A intervalle fixe de 12h, pendant le repas
<u>Stivarga</u>	Régorafénib	à heure fixe, après un repas léger en graisses
<u>Targretin</u>	Bexarotène	à heure fixe, pendant un repas
<u>Venclyxto</u>	Vénétoclax	à heure fixe, de préférence le matin, pendant un repas
<u>Xeloda</u>	Capécitabine	à intervalle fixe de 12h, dans les 30 minutes qui suivent le petit déjeuner et le dîner
<u>Zavedos</u>	Idarubicine	à heure fixe, pendant un repas
<u>Zelboraf</u>	Vémurafénib	à intervalle fixe de 12h, pendant ou peu de temps après un repas
<u>Zykadia</u>	Céritinib	à heure fixe, pendant un repas

Anticancéreux avec une administration « A JEUN ou AVANT REPAS »

Nom commercial	DCI	Recommandations notice
<u>Alkeran</u>	Mephalan	à heure fixe, 15 à 30 minutes avant le repas
<u>Ayvakit</u>	Avapritinib	le matin de préférence, à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après la prise de nourriture)
<u>Belustine</u>	Lomustine	Avec un grand verre d'eau, de préférence le soir au coucher, ou 3h après le repas
<u>Cabometyx</u>	Cabozantinib	à heure fixe. Ne rien manger au moins 2h avant et jusqu'à 1h après la prise
<u>Celltop</u>	Etoposide	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Chloraminophene</u>	Chlorambucil	à heure fixe, le matin à jeun
<u>Endoxan</u>	Cyclophosphamide	à heure fixe, le matin à jeun, avec un grand verre d'eau, puis reprendre un grand verre d'eau immédiatement après
<u>Giotrif</u>	Afatinib	à heure fixe, ne rien manger au moins 3h avant et 1h après la prise
<u>Lanvis</u>	Thioguanine	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Mekinist</u>	Tramétinib	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Nexavar</u>	Sorafénib	à heure fixe, en dehors des repas (1h avant ou 2h après) OU avec un repas pauvre en graisses
<u>Ninlaro</u>	Ixazomib	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Odomzo</u>	Sonidégib	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Scemblix</u>	Asciminib	à intervalle d'environ 12h, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Tafinlar</u>	Dabrafénib	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Tarceva</u>	Erlotinib	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Tasigna</u>	Nilotinib	à intervalle d'environ 12h, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Temodal</u>	Témozolomide	à heure fixe, en dehors des repas (2h après le repas du soir et 1h après l'ondansétron, ne pas re-manger avant 2h)
<u>Tibsovo</u>	Ivosidenib	à heure fixe, en dehors d'un repas. Ne rien manger 2h avant et 1h après la prise
<u>Tyverb</u>	Lapatinib	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Votrient</u>	Pazopanib	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Xaluprine</u>	Mercaptopurine	de préférence le soir, à distance du repas ou d'une consommation de lait/produit laitier (au moins 1h avant ou 2h après)
<u>Zytiga</u>	Abiratérone	à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)

Liste non exhaustive, actualisée en novembre 2023