

Observatoire des Médicaments, des Dispositifs médicaux et des Innovation thérapeutiques – région Centre - OMÉDIT -

**COMMISSION
DOULEUR**

Fiche Bon Usage

PARACÉTAMOL
Forme orale ou injectable

Date de rédaction :
Avril 2001

Date de réactualisation :
Septembre 2013

Quand Prescrire la Forme Injectable ?

- En instauration de traitement d'une douleur aiguë justifiant un délai d'action rapide (< 10 minutes)
- En traitement d'entretien si la voie orale est impossible

Quand Passer à la Forme Orale ?

- Dès que l'alimentation est possible et même s'il existe un abord veineux car en traitement d'entretien l'efficacité des formes orales et injectables est équivalente

Pourquoi utiliser les formes orales?

- Pour limiter les coûts avec une efficacité similaire
- Les formes orodispersibles sont une alternative à proposer dans les services d'urgence

Dépenses Régionales Estimées* en 2012

(* consommations des 41 établissements MCO de la région Centre)

Coût de traitement journalier chez l'adulte (1 g x 3 / jour) :

- Forme injectable ≈ 3,70 €
- Forme orale ≈ 0,06 €
- Forme orale orodispersible ≈ 0,24 €

Dépenses de PARACÉTAMOL oral et suppo au niveau régional : 135 960 €

Dépenses de PARACÉTAMOL injectable au niveau régional : **1 087 200 €**

soit 88,9% des dépenses du palier I

soit 76,7% des dépenses de l'ensemble des paliers