

FICHE DE BONNE PRATIQUE & BON USAGE
Commissions Dispositifs Médicaux & HAD

Validation Comité stratégique : Décembre 2017

Rédaction / Mise à jour : Octobre 2017

Pansements hémostatiques et cicatrisants, stériles, composés d'alginate de calcium

- soit associé à de la carboxyméthylcellulose sodique (CMC) avec un agent de cohésion
- soit pur (100% polyuronate de calcium)

MODES D'ACTION

- **Hémostatiques** par échange d'ions calcium du pansement contre les ions sodium de l'exsudat et du sang. Ce phénomène induit l'activation plaquettaire et une accélération de la fibrinof ormation.
- **Capacités d'absorption** et de **drainage** : les fibres d'alginate gélifient au contact des exsudats de la plaie et maintiennent l'environnement humide nécessaire au déroulement du processus cicatriciel.

INDICATIONS REGLEMENTAIRES

Pour l'ensemble des pansements (selon LPP)	Traitement séquentiel des : - plaies chroniques en phase de détersion - plaies très exsudatives
Indications particulières	Algotéiril® Traitement des plaies hémorragiques
	Coalgan® Epistaxis, saignements cutanés et muqueux chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis

COMPOSITION	ALGINATES + CMC	ALGINATES PURS	
Remboursement LPP	selon ligne générique	selon ligne générique	selon nom de marque
Exemples de noms (liste non exhaustive)	Askina®Sorb, Biatain® alginate, Nu-Derm® alginate, Sorbalgon®plus, Urgosorb® ...	Algisite®M, Kaltostat®, Melgisorb®plus, Suprasorb®A, Tegaderm®alginate ...	Algotéiril® Coalgan® Coalgan®-H <small>(Non remb - usage hospitalier)</small>
Niveau de risque selon le marquage CE	Classe II b (action hémostatique sur plaie superficielle)		Classe III (hémostatique sur plaie profonde) Classe II b
Indication hémorragie	Non		Oui
Durée maximale de pose	1 semaine		48 heures
Coût	+ à ++		+++

RECOMMANDATIONS DE CHOIX EN TANT QU'HÉMOSTATIQUES

- **Plaies superficielles avec saignement** : **Alginates de classe II b** (compresse, mèche)
Exemples : plaies aiguës suintantes, plaies traumatiques superficielles, plaies chroniques : escarres, ulcères de jambe veineux, après avis d'un médecin : plaies infectées superficielles
- **Plaies profondes** hémorragiques, chirurgicales ou tumorales : Algotéiril® (compresse, mèche ronde ou plate)
Exemples : plaies hémorragiques per- et post- opératoires, hémostase endonasale, plaies profondes/ tumorales /cavitaires, perte de substances chirurgicales et traumatiques ou contact avec l'os.
- **Point de ponction** : Coalgan®-H compresse 2x4cm, **Epistaxis** de la tache vasculaire : Coalgan® mèche 4cm
Exemples : dialyse et hémostase pour les patients présentant des troubles de l'hémostase (sous antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants : AVK, AOD, aspirine, AINS, héparine ...)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le pansement peut être humidifié, uniquement avec du NaCl 0.9%. **Ne jamais utiliser de l'eau stérile.**
- Rincer la plaie avec du NaCl 0.9% avant d'appliquer le pansement. Après utilisation de solutions antiseptiques, rincer. Ne pas utiliser avec la chlorhexidine ou l'hypochlorite de sodium (Dakin) en raison de leur incompatibilité.
- Appliquer directement sur la plaie, assurer le maintien à l'aide d'un pansement secondaire (compresses et bande de fixation). Changer le pansement régulièrement pour les plaies infectées ou très exsudatives.
- En radiothérapie, s'interroger sur leur maintien selon la localisation irradiée.