

LENVIMA® Lenvatinib

Votre médecin spécialiste vous a prescrit **LENVIMA®**. Il est indiqué dans certains **cancers de la thyroïde**. La molécule active, le **lenvatinib**, agit en ralentissant la croissance tumorale.

Présentation

Deux dosages sont disponibles sous la forme de boîte de **30 gélules** :

- 4 mg



- 10 mg



Prescription

Ce médicament est prescrit ou renouvelé par un **médecin hospitalier spécialiste** en **cancérologie** ou en **oncologie médicale**.

Il est disponible **uniquement** dans les **pharmacies hospitalières** autorisées à vendre au public.

Posologie et prise

La **dose est strictement personnelle** et ne peut être modifiée au cours du traitement que par votre médecin spécialiste.

La dose habituelle est de : **24 mg/une fois par jour**.

Les gélules sont à **avalent entières** avec un verre d'eau en **une prise par jour**.

Ne pas broyer, ouvrir ou mâcher les gélules.

Essayez de les prendre chaque jour à la **même heure**, au cours ou en dehors d'un repas.

Précaution d'emploi

Les femmes en âge de procréer doivent **absolument** utiliser une **contraception mécanique** (préservatif), même sous contraceptifs hormonaux.



En cas d'oubli d'une prise de **MOINS de 12 heures**, **prenez la dose**.

En cas d'oubli d'une prise de **PLUS de 12 heures**, **ne prenez PAS la dose manquée**.

*La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain (**sans doubler la dose**). Merci de le noter dans votre carnet de suivi.*

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les *médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance)* que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

Conservation

Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.



NE JETEZ PAS les boîtes entamées ni les gélules non utilisées dans votre poubelle.

Merci de les rapporter à votre pharmacien.

INFORMATION

PATIENT

Lenvatinib

LENVIMA®

Votre traitement au quotidien



France Assos Santé
La voix des usagers
Centre-Val-de-Loire



Effets Indésirables possibles

Prévention

Conduite à tenir

Maux de tête, palpitations, vertiges, bourdonnements



Mesurez régulièrement votre **tension**. Faites de l'exercice, **contrôlez votre poids**. Limitez la consommation de **sel** et **d'alcool**.

Contactez votre médecin si ces signes surviennent.

Diarrhées



Si c'est un effet qui arrive souvent : **évit**ez le **café**, les **boissons glacées**, le **lait**, les **fruits** et **légumes crus**, les **céréales**, le **pain complet** et **l'alcool**.

Buvez si possible **2 litres par jour** (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les **féculents** (riz, pâtes...).
Prévenez votre médecin à partir de plus de 3 diarrhées par jour.


Perte d'appétit, nausées et vomissements



Mangez lentement et faites plusieurs **petits repas légers**. **Évit**ez les aliments **gras, frits** et **épicés**. Buvez plutôt entre les repas.

Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en **respectant les doses**.
Prévenez votre médecin à partir de deux vomissements/jour.

Fatigue



Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une **bonne hygiène de vie** (manger et boire sainement).
Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.

Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.


Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds



Évitez le **soleil** et **l'eau chaude**. Évitez les vêtements et les chaussures **trop serrés**. Utilisez un **savon doux sans parfum**.
La station debout et les marches prolongées ne sont pas conseillées. Une consultation chez un pédicure peut être envisagée.

Il s'agit d'un **syndrome mains-pieds**. Trempez les mains et les pieds dans **l'eau fraîche**, puis séchez sans frotter. Appliquez **des crèmes hydratantes** sur les zones atteintes : contactez votre médecin.

Maux de tête, douleurs articulaires et musculaires



Reposez-vous souvent. Faites des exercices légers, évitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.

En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.

Douleurs extrémités, symptômes cardiaques



Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, etc.) et de votre tension.

Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.

Modification du bilan sanguin



Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.

Prenez votre température en cas de doute. En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, **prévenez votre médecin**.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.