

VESANOÏD® Trétinoïne

Votre médecin spécialiste vous a prescrit **VESANOÏD®**. Il est indiqué dans la **leucémie aiguë promyélocytaire (LAP)**.

La molécule active, la **trétinoïne**, agit en ralentissant la croissance tumorale.

Présentation

Un seul dosage est disponible sous la forme d'un flacon de **100 capsules molles de 10 mg**



Prescription

Ce médicament est prescrit ou renouvelé par un **médecin hospitalier spécialiste en oncologie** ou en **hématologie** ou par des médecins compétents en **cancérologie**.

Il est disponible **uniquement** dans les **pharmacies hospitalières** autorisées à délivrer au public.

Posologie et prise

La **dose est strictement personnelle** et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose recommandée est de :

45 mg/m² de surface corporelle en deux prises égales par jour.

Ne pas croquer ou écraser les capsules molles

Essayez de les prendre chaque jour **au cours d'un repas ou peu de temps après.**

Avalez **rapidement** votre comprimé de **VESANOÏD®** 10 mg, avec un **verre d'eau.**

Lavez-vous les mains ensuite.

Précaution d'emploi

Les femmes en âge de procréer doivent **absolument** utiliser une **contraception**, si l'un des deux partenaires est traité par **VESANOÏD®**.

Ne vous exposez pas trop au soleil. En cas d'exposition, **protégez-vous du soleil** : portez des vêtements de protection et appliquez un écran solaire avec un indice de protection élevé.



En cas **d'oubli** d'une prise de **VESANOÏD®**, **ne prenez PAS la dose manquée.**

La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain (sans doubler la dose). Merci de le noter dans votre carnet de suivi et d'en informer votre médecin.

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

Si vous devez vous faire **vacciner** pendant votre traitement par **VESANOÏD®** ou dans les trois mois suivant la fin du traitement, informez votre médecin de la prise de **VESANOÏD®**.

Conservation

À conserver à une température ne dépassant pas **30°C**, dans l'emballage d'origine.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.



NE JETEZ PAS les boîtes entamées ni les capsules non utilisées dans votre poubelle.

Merci de les rapporter à votre pharmacien.

INFORMATION

PATIENT

Trétinoïne VESANOÏD®

Votre traitement au
quotidien



Effets Indésirables

Signes d'infection : fièvre, frissons, douleurs dans la bouche, maux de gorge, problèmes urinaires




Saignements ou hématomes inattendus



Signe de surdosage/intoxication



Affections du système nerveux



Affections cardiaques



Perte d'appétit, troubles gastro-intestinaux



Affections de la peau



Prévention

Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie.

Evitez les chocs et soyez vigilants lors de vos déplacements.

Soyez vigilant à l'apparition de céphalées, nausées, vomissement, sécheresse buccale, affections cutanées, troubles visuels.

Soyez vigilant en cas d'apparition d'état confusionnels d'anxiété, de vertige ou de céphalées.

Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, etc.) et de votre tension.

Manger lentement et faites plusieurs **petits repas légers**. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.

Protégez-vous systématiquement du soleil en préférant les vêtements longs et en utilisant de l'écran total.

Conduite à tenir

En cas de fièvre supérieure à 38°C, consultez votre médecin.

En cas de saignements ou d'hématomes importants et inattendus, consultez votre médecin. Si vous êtes traité par anticoagulants oraux qui nécessite un contrôle de l'INR, il faudra augmenter la fréquence de ces contrôles.

Prévenez votre médecin en cas de cumul de ces symptômes

Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de persistante inhabituelle de ces affections, informez votre médecin

Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.

Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).

Soyez vigilant à l'apparition de rougeur et prévenez votre médecin en cas d'affections cutanées importantes.

Des effets non mentionnés peuvent survenir pendant le traitement. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin.
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.