

XALUPRINE® Mercaptopurine

Votre médecin spécialiste vous a prescrit XALUPRINE®. Il est indiqué dans la **leucémie aiguë lymphoblastique**. La molécule active, la **mercaptopurine**, agit en ralentissant la croissance tumorale.

Présentation

Un seul dosage est disponible sous la forme d'un flacon d'une suspension orale de **20 mg/ml**.

Prescription

Ce médicament est prescrit ou renouvelé par un **médecin hospitalier spécialiste en hématologie** ou aux médecins compétents en **maladie du sang**.

Il est disponible **uniquement** dans les **pharmacies de ville**.

Posologie et prise

La **dose est strictement personnelle** et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin.

Xaluprine® peut être pris **entre ou au cours des repas**, mais **le soir** (tous les jours environ à la **même heure**). Boire un **verre d'eau** après la prise.

Xaluprine® ne doit pas être pris en même temps que **du lait ou des produits laitiers** (la prise du médicament doit être au moins 1 heure avant ou 2 heures après).

Le flacon doit être **agité vigoureusement** pendant **au moins 30 secondes**, afin d'assurer un mélange homogène de la suspension orale.

Toute personne manipulant Xaluprine® doit **se laver les mains** avant et après l'administration d'une dose. Si un soignant/aidant le manipule, il doit mettre des **gants**.

Précaution d'emploi

Les femmes en âge de procréer doivent **absolument** utiliser une **contraception**, si l'un des deux partenaires est traité par XALUPRINE® jusqu'à au moins 3 mois après l'arrêt du traitement.

Ne vous exposez pas trop au soleil. En cas d'exposition, **protégez-vous du soleil** : portez des vêtements de protection et appliquez un écran solaire avec un indice de protection élevé.



En cas **d'oubli** d'une prise de XALUPRINE®, **ne prenez PAS la dose manquée**.

La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain (sans doubler la dose). Merci de le noter dans votre carnet de suivi et d'en informer votre médecin.

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les *médicaments, plantes ou tisanes* (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

Si vous devez vous faire **vacciner** pendant votre traitement par XALUPRINE®, informez votre médecin ou votre infirmière de la prise de XALUPRINE®.

Conservation

À conserver à une température ne dépassant pas **25°C**, dans l'emballage d'origine. Conservez le flacon soigneusement fermé.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.



NE JETEZ PAS les flacons entamés ni les flacons non utilisés dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

INFORMATION

PATIENT

Mercaptopurine

XALUPRINE®

Suspension buvable

Votre traitement au quotidien



Effets Indésirables


Signes d'infection : fièvre, frissons, douleurs dans la bouche, maux de gorge, problèmes urinaires



Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie.

En cas de fièvre supérieure à 38°C, consultez votre médecin.

Saignements ou hématomes Inattendus



Évitez les chocs et soyez vigilants lors de vos déplacements.

En cas de saignement ou d'hématomes importants et inattendus, consultez votre médecin.

Si vous êtes traité par anticoagulants oraux qui nécessitent un contrôle de l'INR, il faudra augmenter la fréquence de ces contrôles.

Troubles hépatiques : Jaunissement du blanc des yeux ou de la peau (jaunisse)



Il est recommandé de surveiller la fonction hépatique. Préférez des repas légers. Évitez les aliments frits, gras, trop sucrés, l'alcool.

Faites régulièrement vos analyses biologiques pour contrôler votre fonction hépatique.

Consultez votre médecin pour une adaptation du traitement (arrêt et réduction de posologie) en fonction des résultats.

Fatigue, faiblesse, essoufflement



Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Ces effets peuvent être la conséquence d'une anémie. Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.

Soyez à l'écoute de votre corps.

Prudence en cas de conduite de véhicules.

En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.

Perte d'appétit, nausées, vomissements




Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Évitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.

Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses.

Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).

Diarrhées



Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.

Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin à partir de plus de 3 diarrhées par jour.

Inflammation de la bouche, ulcères de la bouche



Utiliser une brosse à dents souple, un dentifrice non mentholé, non abrasif et sans additifs ainsi qu'un bain de bouche sans alcool. Privilégier une alimentation liquide, froide, dépourvue d'acidité (vinaigre, noix, gruyère, épices)

Consultez votre médecin.

Des effets non mentionnés peuvent survenir pendant le traitement. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin.
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.