

Modèle de prescription de sortie pour BAS DE COMPRESSION

PRESCRIPTEUR	PATIENT
Nom :	Nom :
Prénom :	Prénom :
Téléphone :	Date de naissance :
Identifiant RPPS :	N° d'assuré :
N° FINESS Etablissement :	

BAS DE COMPRESSION

Date de la prescription : ____ / ____ / 20____ Prescription initiale Renouvellement de prescription

Classe **1** (pas de prise en charge) 10-15 mmHg
 Classe **2** 16-20 mmHg
 Classe **3** 21-36 mmHg
 Classe **4** >36 mmHg

 Chaussette (Bas-jarret)
  Bas-cuisse
  Collant

Nom commercial : Nom du fournisseur :

Non substituable / Substituable (rayer la mention inutile)

Ouverture au bout du pied: fermé ouvert (remboursé si de série)

Autre précision :

Quantité : paire(s)

Modalité de pose : A porter le jour
 Autre(s) modalité(s) :

Si superposition, 2^{ème} paire de bas de classe

Quantité : paire(s)

Sur-mesure :

Aide à l'enfilage (non remboursé) enfiler-bas type Easy Slide ou autre :

.....

Durée : mois, à renouveler : fois

Signature :

Prise en charge


Si port quotidien, **2 paires de bas tous les 4 mois (soit 6 paires par an)**.

« Les caisses d'assurance maladie restent fondées à vérifier la pertinence des délivrances entre 5 et 8 paires/an, bien que cela ne constitue pas une anomalie en soi. Au-delà de 8 paires /an, elles sont légitimes à refuser le remboursement ».

« Un remplacement avant 6 mois (durée de garantie des bas) est possible en cas de détérioration accidentelle, d'évolution de la pathologie ou de modification de la morphologie du patient » (décret du 26/03/01).

Prise de mesures (en cm)

A réaliser idéalement le matin par l'IDE/AS, le kiné ou à la pharmacie



cB : circonférence de la cheville
 cC : circonférence du mollet
 cG : circonférence de la cuisse
 cH : circonférence des hanches
 cT : circonférence de la taille

Chaussette → cB cC lD

Bas-cuisse → cB cG lK

Collant → cB cG lK cH

	Situation clinique	Dispositifs	Modalités
Insuffisance veineuse (selon CEAP)	Varices 3 mm (C2)	● Bas de 16 à 20 mmHg ou bas de 21 à 36 mmHg	Traitement au long cours
	Après sclérothérapie ou chirurgie des varices	● Bas à varices ● Bandes sèches à allongement court	4 à 6 semaines
	Œdème chronique (C3)	● Bas de 21 à 36 mmHg ● Bandes sèches à allongement court ou long	Traitement au long cours avec réévaluation
	Pigmentation, eczéma veineux (C4a)	● Bas de 21 à 36mmHg ● Bandes sèches inélastiques ou allongement court ● Bandes enduites	Traitement au long cours avec réévaluation
	Lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, atrophie blanche (C4b)	● Bandes sèches inélastique ou à allongement long ● Bandes enduites ● Bas de 21 à 36 mmHg	Traitement au long cours avec réévaluation
	Ulcère cicatrisé (C5)	● Bas de 21 à 36 mmHg ou >36 mmHg ● Bandes sèches à allongement court	Traitement au long cours avec réévaluation
	Ulcère ouvert (C6)	● Bandage multi-type en 1 ^{ère} intention ● Bandes sèches inélastique ou allongement court ● Bandes enduites ● Bas >36 mmHg	Jusqu'à cicatrisation complète
Grossesse ou post-partum	Cas général	● Bas de 16 à 20 mmHg	Port recommandé durant toute la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois en cas de césarienne)
	En cas d'affection veineuse chronique associée	● Bas de 21 à 36 mmHg ou >36 mmHg selon la gravité de l'affection veineuse	
Maladie thrombo-embolique veineuse	Thrombose veineuse	● Bandes sèches à allongement court ou long ● Bas de classe 21 à 36 mmHg (membre inférieur) ou manchon de 21 à 36 mmHg (membre supérieur)	
	Prévention du syndrome post-thrombotique après TVP proximale	● Bas de 21 à 36 mmHg ou >36 mmHg	2 ans
Lymphœdèmes	En phase de réduction	● Bandes sèches à allongement court ou inélastique et dispositifs de capitonnage ● 2 ^{ème} intention : manchon pour le membre supérieur, bas pour le membre inférieur Il faut utiliser la pression maximale tolérée.	
	En phase de maintien	● Bas de 21 à 36 mmHg ou >36 mmHg, utiliser idéalement la pression maximale tolérée (au moins 45 mmHg si possible, éventuellement par superposition)	

Pour en savoir plus : **dispositif de compression médicale à usage individuel (HAS – 2010)**

Conseils aux patients

Conseil d'enfilage :

- le matin au lever (ou après 20 minutes sur un membre au repos),
- ne pas appliquer de crème ou lait corporel sur les jambes avant la pose (appliquer le soir au retrait),
- pour éviter de filer les bas : enlever les bagues, couper les ongles courts, possibilité de porter des gants fins,
- si superposition de 2 bas, mettre en premier celui de classe la plus faible.

Modalités de pose :

- retourner le bas jusqu'au talon et enfiler le pied et talon,
- dérouler le bas sur la jambe sans tirer sur le bas,
- si difficultés, utiliser un dispositif d'aide à l'enfilage.

Conseil d'entretien :

- un lavage régulier est conseillé pour préserver l'élasticité des fibres,
- néanmoins le sèche-linge n'est pas recommandé (altère l'élasticité des fibres).

Surveiller les espaces interdigitaux, risque accru de mycose.