



ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS (AOD) : COMMENT SÉCURISER L'ÉTAPE D'ADMINISTRATION ?



Les **Anticoagulants Oraux Directs (AOD)** sont des **médicaments à risque**.
Je respecte la règle des « 5B » de la Haute Autorité de Santé.
Les conséquences des erreurs liées à ces médicaments peuvent être **dramatiques pour les patients**. Si le médecin a initié un traitement par AOD, je vérifie que le résident dispose d'une **carte patient**.



① Je comprends pourquoi les AOD sont des médicaments à risque :

Les AOD ralentissent la coagulation sanguine = ils « fluidifient » le sang.
Le risque majeur avec les AOD est **LE RISQUE HEMORRAGIQUE**.

② J'identifie les AOD :

Apixaban - ELIQUIS® 2 dosages : 2,5 ou 5 mg	Rivaroxaban - XARELTO® 3 dosages : 10, 15 ou 20 mg	Dabigatran - PRADAXA® 3 dosages : 75, 110 ou 150 mg
Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés à de l'eau, du jus de pomme ou de la compote de pomme		Ne pas ouvrir ni mâcher les gélules
<i>Ne pas confondre XARELTO® et XATRAL® (alfuzosine dans l'hypertrophie bénigne de prostate)</i>		<i>Ne pas confondre PRADAXA® et PLAVIX® (antiagrégant plaquettaire)</i>

③ Je connais les facteurs de risques pour repérer les résidents à risque :

Si âge > 85 ans	Si faible poids (< 50kg)	Si insuffisant rénal et/ou hépatique	Si saignements évolutifs ou lésions à risque (ulcère digestif...)	Surdose sous l'effet d'autres médicaments
-----------------	--------------------------	--------------------------------------	---	---

④ Je m'alerte face à l'une de ces situations :

<ul style="list-style-type: none"> × En cas de plus de 2 prises/jour × Si plus de 2 comprimés ou gélules/prise × Si 2 AOD différents pour un même patient × Si AOD + anticoagulant injectable pour un même patient (ex. Lovenox®) × Si AOD + AVK (ex : Préviscan®, Warfarine®) 	<ul style="list-style-type: none"> × En cas de présence de l'un de ces signes <ul style="list-style-type: none"> - Présence de sang dans les selles, - Vomissements sanglants, - Présence d'hématomes spontanés, - Présence de signes d'anémie
--	---

Je contrôle la prescription et j'alerte immédiatement un médecin ou un pharmacien



**EN CAS DE DOUTE,
J'APPELE LE MEDECIN OU LE PHARMACIEN**



⑤ Je sécurise le stockage et la préparation des piluliers :

- **Ne jamais déconditionner** : les AOD sont placés dans le pilulier dans leur **blister d'origine (plaquette entière)**. Ils restent **identifiables au nom du patient jusqu'au moment de leur administration**.
- **Ne jamais les stocker à côté de médicaments ayant des noms à consonance ressemblante**. Penser également à **bien séparer les différents dosages d'un même médicament**.