

# BROYER OU ECRASER, CE N'EST PAS SANS DANGER !




## Mauvaise manipulation :

- ⚡ erreurs de dosage
- ⚡ toxicité possible pour le patient et le soignant
- ⚡ risque de sous dosage/surdosage ou perte d'effet du médicament.

## Tous les médicaments ne sont pas broyables !

⇒ Cf. liste nationale disponible sur le site de l'[OMÉDIT Normandie](#)



## NE PAS ÉCRASER

- Libération prolongée (LP)
- Microgranule enrobé
- Sublingual
- Multicouche
- Orodispersible
- Gastrorésistant

9/10

Dans 9 cas sur 10 une alternative au broyage existe  
Ne broyer qu'en dernier recours

 Les outils de bonne pratique

### LES 10 QUESTIONS À SE POSER

AFIN DE LIMITER LE BROYAGE

#### Le broyage est l'affaire de tous !

1. Un trouble de l'alimentation a-t-il été repéré (AS, IDE) ? (*allongement temps de repas, sélection des aliments selon leur consistance...*)
2. Quel est l'état de déglutition de mon patient ?
3. Le signalement des difficultés à avaler du patient, est-il enregistré ?
4. L'ensemble des soignants sont-ils informés de ce trouble de la déglutition (médecin, pharmacien, IDE, AS) ?
5. Quel médicament n'arrive-t-il pas à avaler ?
6. Le traitement a-t-il été réévalué ? (*balance bénéfice/risque, nécessité de poursuivre le traitement...*)
7. Existe-il des alternatives pour faciliter l'administration de ce médicament ? (*autre forme orale (comprimé effervescent, orodispersible...), autre voie d'administration*)
8. Sinon, ce médicament est-il broyable ou écrasable ?
9. Le broyage et son motif sont-ils PRESCRITS ?
10. Les bonnes pratiques de broyage sont-elles suivies (*outil adapté, au plus proche de l'administration...*) ?

Le broyage doit être une exception ! 



Uniquement sur prescription médicale  
après avis du pharmacien

@

Outils disponibles sur le site  
de l'[OMÉDIT Centre-Val de Loire](#)

- **Flyer** « Les 10 questions à se poser afin de limiter le broyage »
- **E-learning** « Couper, écraser un comprimé ? Ouvrir une gélule ? Comment administrer en toute sécurité ? »