

Conserver les SOLUTIONS BUVABLES après ouverture ?

Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques de la région Centre-Val de Loire

UN dispositif d'administration (pipette, seringue doseuse) = UN médicament



Garder propre la pipette ou la seringue doseuse dans la boîte du médicament correspondant pour ne pas la mélanger avec une autre

**Bien reboucher après utilisation.
Conserver le flacon de solution buvable à l'abri de la lumière et de la chaleur.**

- LA PHARMACIE ① RENSEIGNE SUR L'ÉTIQUETTE (cf. modèle) LA DURÉE DE CONSERVATION APRÈS OUVERTURE PUIS ② COLLE L'ÉTIQUETTE SUR LE FLACON DÉLIVRÉ (pas sur le bouchon).**
- L'INFIRMIER(E) RENSEIGNE LA DATE D'OUVERTURE ET LA DATE DE FIN D'UTILISATION.**

Conservation Après Ouverture
..... Mois / Jours
Ouvert le / / 20
Périmé le / / 20

Il est pratiquement impossible d'établir une liste dont l'exhaustivité et l'exactitude soient garanties ; les données peuvent différer selon les sources documentaires. Ce tableau est une aide qui ne vous dispense pas d'une recherche de donnée adaptée au cas par cas et à la situation donnée..

Liste non exhaustive, données issues de [Thériaque](#) et [la base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr](#) Mars 2025.

Dénomination commune (par ordre alphabétique)	Médicament	Conservation APRES ouverture	Conditions de conservation
Alfacalcidol	UN-ALFA 0,1 µg/goutte, sol buv, flac 10 mL	4 mois	entre +2°C et +8°C abri de la lumière, ne pas congeler
Alimémazine	THERALENE 4%, sol buv en gouttes, flac 30 mL ou 100 mL	7 mois	< 25°C abri de la lumière
Amitriptyline	LAROXYL 40 mg/mL buv flac 20mL	1 mois	<25°C
Aripiprazole	ABILIFY 1mg/mL, sirop, flac 150 mL	6 mois	<25°C
Betaméthasone	BETAMETHASONE 0,05% sol buv en gouttes, flac 30 mL	2 mois	abri de la lumière
	CELESTENE 0,05%, sol buv en gouttes, flac 30 mL	3 mois	< 30°C abri de la lumière
Calcifédiol	DEDROGYL, sol buv en gouttes, flac 10 mL	3 mois	< 25°C abri de la lumière
Cétirizine	CETIRIZINE 10 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 15 mL	1 mois	abri de la lumière
Cétirizine	ZYRTEC 10 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 15 mL	3 mois	abri de la lumière
Chlorpromazine	LARGACTIL 4%, sol buv en gouttes, flac 30 mL ou 125 mL	1 mois	< 25°C abri de la lumière
Clonazépam	RIVOTRIL 2,5 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 20 mL	4 mois	< 25°C abri de la lumière
Colécalciférol	ZYMAD 10 000 iu/mL, sol buv, flac compte-gouttes 10 mL	3 mois	< 25°C abri de la lumière
	ADRIGYL 10 000 iu/mL, sol buv en gouttes, flac 10 mL	3 mois	< 25°C
Cyamémazine	TERCIAN 40 mg/mL, sol buv gouttes, flac 30 mL ou 100 mL	1 mois	< 30°C abri de la lumière
Diazépam	VALIUM 1%, sol buv en gouttes, flac 20 mL	3 mois	< 25°C
Digoxine	DIGOXINE 5 µg/0,1 mL sol buv en gouttes, flac 60 mL	2 mois	abri de la lumière
Ergocalciférol	STEROGYL, sol buv en gouttes, flac 20 mL	3 mois	< 25°C abri de la lumière
Escitalopram	SEROPLEX 20 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 15 mL	2 mois	< 25°C
Flupentixol	FLUANXOL 4%, sol buv en gouttes, flac 10 mL	15 jours	<25°C abri de la lumière
Halopéridol	HALDOL 2 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 30 mL	3 mois	<25°C, ne pas congeler abri de la lumière
Levetiracetam	KEPPRA (et générique) sol buv 100mg/mL	7 mois	abri de la lumière
Lévothyroxine	L-THYROXINE 150 µg/mL, sol buv en gouttes, flac 15 mL	1 mois	entre +2°C et +8°C
Loxapine	LOXAPAC 25 mg/mL, sol buv , flac 30 mL	30 jours	abri de la lumière
Oxomémazine	TOPLEXIL (et générique) sol buv, 0,33mg/mL	6 mois	< 25°C abri de la lumière
Pipamperméone	DIPIPERON 40 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 30 mL	1 mois	< 25°C
Polyvitamines	HYDROSOL POLYVITAMINE, sol buv en gouttes, flac 20 mL	20 jours	< 25°C
Phosphore	PHOSPHONEUROS, sol buv en gouttes, flac 120 mL	1 mois	< 25°C abri de la lumière
Prazepam	LYSANXIA 15 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 20 mL	1 mois	< 25°C
Rispéridone	RISPERDAL 1 mg/mL sol buv, flac 120mL	3 mois	<30°C, ne pas congeler, ne pas mettre au réfrigérateur
Tiapride	TIAPRIDAL 138mg/ml, sol buv flac 30 mL	45 jours	<25°C
Trihexyphénidyle	ARTANE 0,4%, sol buv en gouttes, flac 30 mL	2 mois	abri de la lumière
Zuclopenthixol	CLOPIXOL 2%, sol buv en gouttes, flac 20 mL	6 semaines	< 25°C abri de la lumière

Péremption courte (< 1 mois)

FLUANXOL (flupentixol) : 15 jours après ouverture
HYDROSOL POLYVITAMINE : 20 jours après ouv.

Conservation particulière entre +2°C et +8°C

L-THYROXINE (lévothyroxine)
UN-ALPHA (alfacalcidol)



Voir sur site de l'ANSM
Affiche « Ne vous mélangez pas les pipettes »
[affiche disponible ici](#)

Voir sur le site de l'OMEDIT Centre-Val de Loire
Fiche « Bonnes pratiques de préparation et d'administration des solutions buvables multi doses »
[fiche disponible ici](#)