


# NEUROLEPTIQUES INJECTABLES À ACTION PROLONGÉE DITS "RETARD"

OMéDIT CVL - CoTech psychiatrie – date de création : juin 2025 – date de mise à jour : Septembre 2025

## INJECTION IM EN GLUTEAL (FESSIER) UNIQUEMENT



Zone ventro glutéale



Zone dorso glutéale

**Privilégier la zone ventro-glutéale:** moins douloureuse et plus sûre (absence de structure nerveuse et vasculaire)



[OLANZAPINE \(ZYPADHERA®\)](#)

210mg, 300mg, 405mg

**dose initiale et dose d'entretien après 2 mois**



[HALOPERIDOL \(HALDOL DECANOAS®\)](#)

Ampoule 50mg/1mL

50 à 300mg **toutes les 4 semaines**

[FLUPENTIXOL \(FLUANXOL LP 100mg/1mL®\)](#)

20 à 300mg **toutes les 2 à 3 semaines**



[ARIPIPRAZOLE \(ABILIFY MAINTENA®\)](#)


Seringue pré-remplie 720mg et 960mg

960mg (720mg si mauvaise tolérance) **toutes les 8 semaines**

[ZUCLOPENTHIXOL \(CLOPIXOL ASP 50mg/1mL®\)](#) (ASP : Action semi-prolongée)  
50 à 150mg **tous les 2 à 3 jours**

[ZUCLOPENTHIXOL \(CLOPIXOL AP 200mg/1mL®\)](#) (AP : Action prolongée)  
200 à 400mg **toutes les 2 à 4 semaines**

## INJECTION IM EN GLUTEAL (FESSIER) OU EN DELTOÏDE



Zone ventro glutéale



Zone dorso glutéale

[PALIPERIDONE \(XEPLION®\)](#) Seringue pré-remplie  
25mg, à 50mg, à 75mg, à 100mg, à 150mg  
**150mg à J1 puis 100mg à J8 puis toutes les 4 semaines**

*Le J1 et le J8 doivent être exclusivement injectés dans le muscle deltoïde*



[PALIPERIDONE \(TREVICTA®\)](#) Seringue pré-remplie  
175mg, 263mg, 350mg, 525mg  
**175 à 525mg tous les 3 mois**

**Privilégier la zone ventro-glutéale:** moins douloureuse et plus sûre (absence de structure nerveuse et vasculaire)



Zone du deltoïde

[ARIPIPRAZOLE \(ABILIFY MAINTENA®\)](#)  
Seringue pré-remplie 300, 400mg  
400mg x2 puis 400mg (300mg si mauvaise tolérance)  
**toutes les 4 semaines**



[RISPERIDONE \(RISPERDAL CONSTA LP®\)](#)  
25mg ; 37,5mg ; 50mg  
25 à 50mg **tous les 14 jours**



[PIPOTIAZINE PALMITATE \(PIPORTIL L4®\)](#)  
ampoule de 25mg/mL ou 100mg/20mL  
**25 à 200mg toutes les 2 à 4 semaines**



## RISQUE DE CONFUSION AVEC LES FORMES INJECTABLES À ACTION IMMÉDIATE

[ARIPIPRAZOLE \(ABILIFY®\)](#) 9,75mg/1,3mL IM **1 à 3x/j**

[HALOPERIDOL \(HALDOL®\)](#) 5mg/1mL IM **1 à 4x/j**

[OLANZAPINE \(ZYPREXA®\)](#) 10mg/2mL IM **dose max 10mg 2x/j**

