

## Principes généraux

- Ne pas sortir à l'avance les gélules ou les comprimés de leur blister (certains sont sensibles à la lumière, à l'oxygène).
- Ne pas « déconditionner » pour plus de 7 jours. En cas de risque d'oubli de prise, découper l'emballage (blister) et placer dans un pilulier semainier.
- Ne pas couper, écraser les comprimés, ou ouvrir les gélules.
- Ne pas administrer avec de l'eau chaude ou de l'eau gazeuse, du jus de pamplemousse (contre-indiqué avec la plupart des médicaments).

### Présentation en 2 parties :

Objectifs : répondre à la demande des infirmiers sur les recommandations quant aux risques d'interactions entre les aliments du repas et les anticancéreux administrés par voie orale.

Sur les noms commerciaux, vous trouverez **des liens** renvoyant chaque molécule à sa fiche correspondante. Vous trouverez une liste sur le site d'Omédit Bretagne-Normandie-Pays de la Loire regroupant l'intégralité des molécules ayant une fiche VOC à date en cliquant sur le lien suivant : <https://www.omedit-fiches-cancer.fr/fiches-voie-orale-contre-le-cancer-voc/fiches-voie-orale-contre-le-cancer-voc,6093,13536.html> et [SFPO - Société Française de Pharmacie Oncologique](#)

- Les anticancéreux oraux « pendant ou après repas » correspondant aux mentions : **privilégiez une administration à heure fixe avec un grand verre d'eau et en fin de repas.**
- Les anticancéreux oraux « à jeun » correspondant aux mentions : **privilégiez une administration à heure fixe le matin à jeun 1 heure avant le repas (ou 3h après une prise de nourriture).**

## Anticancéreux avec une administration « A JEUN ou EN DEHORS DU REPAS »

Nom commercial	DCI	Recommandations notice
<u>Akeega®</u>	Niraparib-abiratrone	À jeun au moins 1 heure avant ou 2 heures après avoir mangé
<u>Alkeran®</u>	Mephalan	À heure fixe, 15 à 30 minutes avant le repas
<u>Ayvakit®</u>	Avapritinib	Le matin de préférence, à heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après la prise de nourriture)
<u>Cabometyx®</u>	Cabozantinib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après la prise de nourriture)
<u>Celltop®</u>	Etoposide	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Chloraminophene®</u>	Chlorambucil	À heure fixe, le matin à jeun
<u>Endoxan®</u>	Cyclophosphamide	À heure fixe le matin à jeun, en buvant une quantité suffisante de liquide lors de la prise et immédiatement après
<u>Estracyt®</u>	Estramustine phosphate	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Finlee®</u>	Dabrafénib	À heure fixe, en dehors des repas au moins 1h avant ou 2h après le repas (Du lait maternel et/ou infantile peut être donné à la demande si le patient ne peut pas rester à jeun.)
<u>Gavreto®</u>	Pralsetinib	À heure fixe à jeun (au moins 1h avant ou 2 h après le repas)
<u>Giotrif®</u>	Afatinib	À heure fixe, en dehors des repas, ne rien manger au moins 3h avant et 1h après la prise

<u>Lanvis®</u>	Thioguanine	À heure fixe, en dehors des repas
<u>Lomustine-Medac®</u>	Lomustine	De préférence au coucher ou 3 heures après un repas
<u>Mekinist®</u>	Traméatinib	À heure fixe en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2 h après le repas)
<u>Nexavar®</u>	Sorafénib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas.) ou avec un repas pauvre en graisses.
<u>Ninlaro®</u>	Ixazomib	À heure fixe en dehors d'un repas (au moins 1 h avant ou 2 h après le repas)
<u>Odomzo®</u>	Sonidégib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Scemblix®</u>	Asciminib	À heure fixe, à 12h d'intervalle en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après un repas)
<u>Siklos®</u>	Hydroxycarbamide	À heure fixe, de préférence le matin avant le petit déjeuné
<u>Spexotras®</u>	Traméatinib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Tafinlar®</u>	Dabrafénib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Tarceva®</u>	Erlotinib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Tasigna®</u>	Nilotinib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Temodal®</u>	Témozolomide	À heure fixe, en dehors des repas (2h après le repas du soir et 1h après l'ondansétron, ne pas re-manger avant 2h)
<u>Thalidomide®</u>	Thalidomide	A heure fixe, le soir avant le coucher
<u>Tibsovo®</u>	Ivosidenib	À heure fixe, en dehors d'un repas. Ne rien manger 2h avant et 1h après la prise
<u>Tyverb®</u>	Lapatinib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Votrient®</u>	Pazopanib	À heure fixe, en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après le repas)
<u>Xaluprine®</u>	Mercaptourine	À heure fixe, de préférence le soir, à distance du repas ou d'une consommation de lait/produit laitier (au moins 1h avant ou 2h après)
<u>Zejula®</u>	Niraparib	À heure fixe (de préférence le soir au coucher si nausée), en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2 h après) ou avec un repas léger

### Anticancéreux oraux avec administration « PENDANT ou A LA FIN DU REPAS »

Nom commercial	DCI	Recommandations notice
<u>Alecensa®</u>	Alectinib	À heure fixe, pendant les repas
<u>Bosulif®</u>	Bosutinib	À heure fixe, de préférence le matin, pendant un repas
<u>Glivec®</u>	Imatinib	À heure fixe, pendant un repas
<u>Hexastat®</u>	Altrétamine	À heure fixe, après les repas
<u>Ibrance®</u>	Palbociclib	À heure fixe, de préférence pendant un repas, <b>avec de la nourriture</b>
<u>Lonsurf®</u>	Trifluridine/Tipiracil	<b>Dans l'heure qui suit la fin des repas du matin et du soir</b>

<u>Navelbine®</u>	Vinorelbine	À la <u>fin d'un repas</u> , <b>1 prise par semaine</b> à jour et heure fixe
<u>Neofordex®</u>	Dexaméthasone	À heure fixe, le matin, de préférence au <b>milieu du repas</b>
<u>Piqray®</u>	Alpélisib	À heure fixe, <b>immédiatement après de la nourriture</b>
<u>Rydapt®</u>	Midostaurine	À intervalle fixe de 12h, pendant le repas
<u>Stivarga®</u>	Régorafénib	À heure fixe, <b>après un repas léger en graisses</b>
<u>Targretin®</u>	Bexarotène	À heure fixe, pendant un repas
<u>Venlyxto®</u>	Vénétoclax	À heure fixe, de préférence le matin, pendant un repas
<u>Versanoid®</u>	Trétinoïne	À heure fixe, pendant ou peu de temps après les repas
<u>Xeloda®</u>	Capécitabine	À intervalle fixe de 12h, dans les <b>30 minutes qui suivent le petit déjeuner et le dîner</b>
<u>Zavedos®</u>	Idarubicine	À heure fixe, <b>pendant un repas léger, pendant 3 jours ou une seule prise par semaine</b>
<u>Zelboraf®</u>	Vémurafénib	À heures fixes ( <b>idéalement 12h entre chaque prise</b> ) au cours ou peu de temps après un repas
<u>Zykadia®</u>	Céritinib	À heure fixe, pendant un repas

### Anticancéreux avec une administration « PAS D'INFLUENCE DU BOL ALIMENTAIRE »

Nom commercial	DCI	Recommandations notice
<u>Afinitor®</u>	Evérolimus	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas ( <b>de façon constante</b> )
<u>Alunbrig®</u>	Brigatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Balversa®</u>	Erdafitinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Braftovi®</u>	Encorafenib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Brukinsa®</u>	Zanubrutinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Calquence®</u>	Acalabrutinib	À heure fixe ( <b>idéalement à 12h d'intervalle</b> ), pendant ou en dehors des repas
<u>Caprelsa®</u>	Vandetanib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Cotellic®</u>	Cobimétinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Erivedge®</u>	Vismodegib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Exkivity®</u>	Mobocertinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Farydak®</u>	Panobinostat	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Fludara®</u>	Fludarabine	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Hycamtin®</u>	Topotecan	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Hydrea®</u>	Hydroxycarbamide	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Iclusig®</u>	Ponatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Idhifa®</u>	Enasidenib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Imbruvica®</u>	Ibrutinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas ( <b>de façon constante</b> )
<u>Inlyta®</u>	Axitinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Imovid®</u>	Pomalidomide	À heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas
<u>Inrebic®</u>	Fédratinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas, mais il est préférable de le prendre avec des aliments <b>pour éviter les vomissements</b>
<u>Iressa®</u>	Géfitinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Jakavi®</u>	Ruxolitinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Kisplyx®</u>	Lenvatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Kisqali®</u>	Ribociclib	À heure fixe, de préférence le matin pendant ou en dehors du repas
<u>Koselugo®</u>	Sélumétinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Krazati®</u>	Adagrasib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas, <b>avec de l'eau</b> (ne

		buvez pas d'autres liquides, y compris des boissons acides comme des jus de fruits)
<u>Lenvima®</u>	Lenvatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Lorviqua®</u>	Lorlatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Lumykras®</u>	Sotorasib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Lynparza®</u>	Olaparib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Lytgobi®</u>	Futibatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Mektovi®</u>	Binimetinib	À heures fixes ( <b>12 heures d'intervalle entre 2 prises</b> ), pendant ou en dehors des repas
<u>Myleran®</u>	Busulfan	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Natulan®</u>	Procarbazine	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Nexpovio®</u>	Sélinexor	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Novatrex®</u>	Méthotrexate	À heure fixe, <b>une seule fois par semaine</b> au cours ou en dehors d'un repas
<u>Ofev®</u>	Nintédanib	À heures fixes ( <b>à 12h d'intervalles</b> ), il est recommandé de les prendre <b>avec des aliments</b> , pendant ou juste avant ou après un repas
<u>Omijara®</u>	Momélotinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Onureg®</u>	Azacitidine	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Pemazyre®</u>	Pemigatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Purinethol®</u>	Mercaptopurine	<b>Le soir</b> à heure fixe pendant ou en dehors du repas ( <b>au moins 1 heure avant ou 2 heures après avoir consommé du lait ou des produits laitiers</b> )
<u>Qinlock®</u>	Ripretinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Retsevmo®</u>	Selpercatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Revlimid®</u>	Lenalidomide	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Rozlytrek®</u>	Entrectinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Rubraca®</u>	Rucaparib	À heures fixes ( <b>à 12 heures d'intervalle</b> ), pendant ou en dehors des repas
<u>Sprycel®</u>	Dasatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Sutent®</u>	Sunitinib malate	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Tabrecta®</u>	Capmatinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Tagrisso®</u>	Osimertinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Talzenna®</u>	Talazoparib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Tazverik®</u>	Tazemetostat	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Tuksya®</u>	Tucatinib	À heures fixes ( <b>à 12 heures d'intervalle</b> ), pendant ou en dehors des repas
<u>Vanflyta®</u>	Quizartinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Vercyte®</u>	Pipobroman	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Verzenios®</u>	Abémaciclib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Vitrakvi®</u>	Larotrecinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Votubia®</u>	Evérolimus	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas ( <b>de façon constante</b> )
<u>Xagrid®</u>	Anagrélide	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Xalkori®</u>	Crizotinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Xospata®</u>	Giltéritinib	À heure fixe, pendant ou en dehors des repas
<u>Zydelig®</u>	Idéralisib	À heures fixes ( <b>idéalement à 12h d'intervalle</b> ), pendant ou en dehors des repas

Liste non exhaustive, actualisée en Mai 2025