

**Quick Audit**

## Evaluation du Bon Usage du PARACETAMOL chez l'adulte

### OBJECTIFS :

- 1) Evaluation des bonnes pratiques d'utilisation :
  - ⇒ **Pour s'assurer que la dose totale cumulée est compatible avec l'état du patient**
- 2) Resensibilisation pour remplacer rapidement la forme injectable par une forme *per os* lorsque possible :
  - ⇒ **Pour limiter les risques liés au maintien d'une voie veineuse**
  - ⇒ **Pour limiter les dépenses liées au paracétamol injectable** (coût ≈30 fois supérieur à la forme orale)

*Cette grille doit être remplie par les auditeurs habilités à consulter les prescriptions de médicaments*

Nom du secteur audité : .....

Initiales de l'auditeur : .....

Date : ..... / ..... / 20.....

Initiale ou n° de la prescription évaluée : .....

### Contexte d'utilisation si prescription de paracétamol injectable :

- 1) La voie injectable est-elle justifiée par l'impossibilité d'utiliser la voie orale ? : .....  Oui  Non
- 2) La voie injectable est-elle justifiée par l'urgence d'obtenir un effet antalgique ? : .....  Oui  Non  
(Nécessité d'un délai d'action en 10 minutes, contre 30 minutes par voie orale)
- 3) La voie injectable est-elle justifiée par une douleur d'intensité modérée (3<EVA<5), en période en post-opératoire immédiate ? : .....  Oui  Non

### Evaluation de la posologie de paracétamol (formes orales et injectable) :

*Rq : la quantité de paracétamol totale prend en compte les prescriptions en « si besoin » ou autorisées en auto-administration par le patient*

**Quelle est la quantité totale de paracétamol prise par le patient ? ..... grammes /jour**

- 1) Le patient souffre-t-il d'une douleur modérée à intense (EVA ≥ 4) ? : .....  Oui  Non  
⇒ Si oui, prend-t-il d'autres antalgiques associés au paracétamol ? .....  Oui  Non
- 2) L'âge du patient :
  - > 75 ans ? : .....  Oui  Non
  - > 65 ans et polypharmacologique (avec ALD) ? .....  Oui  Non
- 3) Patient avec amaigrissement récent, malnutrition chronique, jeûne ? : .....  Oui  Non
- 4) Le patient a-t-il un poids inférieur à 50 kg : .....  Oui  Non
- 5) Ses fonctions rénale et/ou hépatique sont-elles diminuées ? : .....  Oui  Non
- 6) Le patient est en état de déshydratation ? : .....  Oui  Non

Pour l'évaluation cf. infra avec la fiche « Bon usage du paracétamol : forme orale ou injectable », disponible sur notre site internet.

## MISE EN ŒUVRE DE L'EPP

L'EPP doit être conduite par des personnes habilitées à consulter la prescription ou plan de prise des médicaments.

**Nombre de prescriptions à évaluer :** Evaluation des pratiques à partir de deux listes patients recevant du paracétamol sur une période donnée :

- Liste des patients ayant du paracétamol **oral**
- Liste des patients ayant du paracétamol **injectable**

Déterminer à l'aide d'une table d'échantillonnage (norme NF ISO 2859-1) la taille des échantillons (= le nombre de patients) pour un résultat d'audit avec un niveau de qualité acceptable.

Effectif	Niveau élevé
2 à 8	3
9 à 15	5
16 à 25	8
26 à 50	13
51 à 90	20
31 à 150	32
151 à 280	50
281 à 500	80

Exemple : un secteur avec 28 patients ayant du paracétamol doit évaluer au moins 13 prescriptions

Audit réalisé du ..... / ..... au ..... /20 .....

Nombre de prescriptions examinées : patients avec formes orales Z = ..... , avec forme injectable Y = .....

### Synthèse des évaluations pour les prescriptions de paracétamol injectable :

1) Nombre de patients où la voie orale est impossible :	
2) Nombre de patients justifié par l'urgence d'obtenir l'effet antalgique :	
3) Nombre de patient avec 3<EVA<5, en période post opératoire :	

Nombre total de dossier patient où la voie injectable est justifiée =  $\frac{1+2+3}{Y} \times 100 = ..... \%$

Sur ..... patients, dans ..... % des cas il est retrouvé une utilisation de la voie injectable conforme aux indications AMM.

### Synthèse des évaluations sur les posologies de paracétamol prescrites :

Nombre de patient avec une quantité de paracétamol excessive > 4g /jour	
Nb patient avec quantité totale de paracétamol adaptée (max 3g /jour ; 4g /jour si justifiée)	

Sur ..... patients, dans ..... % des cas il est retrouvé une quantité totale de paracétamol administrée conforme aux besoins thérapeutiques du patient.

Selon les résultats, définir un plan d'action (si nécessaire) :

OBJECTIFS	ACTIONS	PILOTES	ECHEANCE	INDICATEURS SUIVIS