

DCI (Dénomination Commune Internationale)	Libellé UCD (nom du médicament)	Broyage	Vigilance	Commentaires (alternative préférentielle, point de vigilance toxicité...)	Interactions à risque (ex : CYP P450, AVK (antivitamines K)..)	Adaptation à la fonction rénale	Charge anticholinergique	Recommandations pour l'administration
PANTOPRAZOLE	PANTOPRAZOLE 20 mg ARROW GENERIQUE, cpr gastro-résistant			<p>La pertinence du traitement est à réévaluer fréquemment</p> <p>Kit "Bon usage des IPP" (inhibiteurs de la pompe à protons) à télécharger sur le site de l'Omédit CVL ou en suivant ce lien :</p> <p>[Cliquez ICI]</p> <p>Alternative : lansoprazole orodispersible, inextium® 10 mg Sachet buvable</p>	<p>Modification de l'absorption :</p> <ul style="list-style-type: none"> - surveillance renforcée des patients traités par warfarine (AVK) ; - interaction avec les anticancéreux oraux de la classe des inhibiteurs de tyrosine kinase : PERTE d'EFFICACITE 	Pas d'adaptation nécessaire		A avaler entier avant un repas, sans croquer ni écraser le comprimé
ANTIEMETIQUES ET ANTINAUSEEUX								
DOMPERIDONE	DOMPERIDONE 10 mg ARROW, cpr orodispersible	NE	R	<p>Vigilance MPI : se référer à l'encadré en début de classe pour plus de précisions</p> <p>A n'utiliser qu'en l'absence de toute alternative, chez le patient atteint de la maladie de Parkinson</p> <p>Durée de traitement : 7 jours maximum</p> <p>Alternative : solution buvable</p>	<p>Substrat du CYP 3A4.</p> <p>Contre-indication avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4 (ex : certains médicaments du VIH, antifongiques, et antibiotiques) : risque de surdosage</p> <p>Si possible, interroger un pharmacien lors de la prescription</p> <p>Contre-indication avec les médicaments allongeant l'intervalle QT, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le citalopram et l'escitalopram - l'amiodarone et le sotalol 	<p>En cas d'insuffisance rénale, la posologie doit être réduite à 1 à 2 prises par jour</p>	CIA-1	<p>Prise avant le repas, pour une absorption plus rapide, à heure fixe</p> <p>Ne pas doubler la prise en cas d'oubli</p>
METOPIMAZINE	VOGALENLYOC® 7,5 mg, hypophisat oral			<p>Vigilance MPI : se référer à l'encadré en début de classe pour plus de précisions</p> <p>Précaution d'emploi en cas de maladie de parkinson</p> <p>Alternative : forme suppositoire</p>		Risque de surdosage chez l'insuffisant rénal		<p>Prise 15 min avant les repas</p> <p>A laisser dissoudre sur la langue sans croquer ou dissoudre le comprimé dans un demi-verre d'eau</p>